

Engystol - 50 tabl
Engystol - 50 tabl type unknown

Engystol - 50 tabl

HEEL1000461

Buy this product at <https://www.preprod.supplentia.com/heel1000461-engystol-50-tabl>

Engystol® is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze. (status AV)
Heel Engystol tabletten is een homeopathisch geneesmiddel. Als gevolg van de gewijzigde wetgeving in 2012 mag op de verpakking niet meer vermeld worden waar dit middel voor bedoeld is. Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Description

Gebruik

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 12 tabletten per dag.

Kinderen van 6 tot 12 jaar:

2 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 8 tabletten per dag.

Kinderen van 2 tot 6 jaar:

1 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 6 tabletten per dag.

De tabletten bij voorkeur in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en dan doorslikken. Voor kleine kinderen kunnen de tabletten fijngedrukt worden tussen twee lepels.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

[Bijsluiter](#)

Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van Engystol® geen bijwerkingen bekend.

Wanneer mag u Engystol® niet gebruiken?

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Engystol®?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Engystol® moet zijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kan Engystol® tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Gebruik van Engystol® in combinatie met andere geneesmiddelen

Tot op heden zijn van Engystol® geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Voor zover bekend beïnvloedt Engystol® bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te besturen niet.

Composition

Sulphur D4, D10

Vincetoxicum officinale D6, D10, D30

Hulpstoffen: Lactose, magnesiumstearaat

Form:	Tablet
Raw Material:	White swallow-wort